


		Mycotal Erk-nr: 10739P/B	Trianium P Erk-nr:9793P/B	Trianium G Erk-nr: 9851P/B
	actieve stof:	Akanthomyces muscarius	Trichoderma harzianum stam T22	Trichoderma harzianum stam T22
Erkenning BE of gebruikersrichtlijn	gewasgroep (sierpl, sierbomen,...)	sierplanten	alle teelten	alle teelten
	indoor/outdoor	indoor	indoor / outdoor	indoor / outdoor
	ziekten/plagen	Witte vlieg, trips en bladluis	Pythium, Fusarium, Rhizoctonia	Pythium, Fusarium, Rhizoctonia
	l/ha of kg/ha product EN/OF ml/l of g/l product	Witte vlieg: 100g/100l Trips/luis: 200g/100l	15-30g/1000 planten	375g-750g/m ³
	aantal toepassingen (+ interval)	Witte vlieg: 2-24 Trips/luis: 2-12 (7 dagen)	1-12/12 maand	1- 4/12 maand
werking (insecticiden)	opname in plant (W,T,LS,...)*	neen	nvt	nvt
	werking op insect/mijt (C,M,D)*	contact	nvt	nvt
	werking tegen stadia (E,L,N,A)*	Wv: E,L,A; Trips: L,A; Luis: N,A	nvt	nvt
	werkingsnelheid (nawerking)	Afdoding na 7-10d	nvt	nvt
	neveneffect op sluipwespen	neen	nvt	nvt
	neveneffect op roofmijten	neen	nvt	nvt
werking (fungiciden)	opname in plant (W,T,LS,...)*	nvt	neen	neen
	neveneffect op sluipwespen	nvt	neen	neen
	neveneffect op roofmijten	nvt	neen	neen

		Mycotal	Trianum P	Trianum G
optimale toepassing	preventief/curatief	curatief	preventief	preventief
	sputen/aangieten/...	sputen	aangieten	strooien
	vloeistof: l/are of kg/are	WG: max 24kg/ha/12 maand	WG	WG
	solo OF combineren met hulpstof of GBM	Solo of met hulpstof Combi GBM: zie Database met neveneffecten Koppert België	Database met neveneffecten Koppert België	Database met neveneffecten Koppert België
	1. invloed T° 2. invloed RV 3. invloed licht 4. invloed pH 5. invloed watertemptr	1. 5-30°C 2. (55%-) 65-90% 3. ... 4. 4-10 5. ...	1. 10-34°C 2. ... 3. ... 4. 4-8 5. ...	1. 10-34°C 2. ... 3. ... 4. 4-8 5. ...
	moment van toepassen	Late namiddag/avond
	andere
	goede resultaten	tegen ziekte of plaag in gewas(sen)	Witte vlieg, luis en trips Groententeelt, kleinfruit en sierteelt	Pythium, Fusarium Zowel groene als bloeiende planten



Koppert



Mycotal

www.koppert.be/mycotal

www.koppert.be/mycotal-bestrijding-witte-vlieg-en-trips/#proefresultaten



Nieuwe Mycotal:

- Blastosporen ipv conidiosporen:
 - beter oplosbaar in water
 - snellere kieming en infectie
 - virulenter
 - koel bewaren!

Producten:

- Verpakking: 500g

Werking op luis



Werking op witte vlieg







Koppert

Trianum-P / -G

www.koppert.be/trianum-p / www.koppert.be/trianum-g



Werkingsmechanismen Trianum:

- Concurrentie om ruimte
- Concurrentie om nutriënten
- Parasitisme schadelijke schimmels
- Versterking van de plant:
 - Verbeterde nutriëntenopname
 - Betere wortelontwikkeling
 - ISR: geïnduceerde systemische resistentie

Producten:

- Trianum G ($1,5 \times 10^8$ cfu/g): 5kg en 20kg
- Trianum P (1×10^9 cfu/g): 500g en 5kg