

		Siltac SF
	actieve stof:	*geen
Erkenning BE of gebruikers- richtlijn	gewasgroep (sierpl, sierbomen,...)	Alle gewassen
	indoor/outdoor	Beide
	ziekten/plagen	Witte vlieg, Spint, Bladluis, Trips, Psylla
	l/ha of kg/ha product EN/OF ml/l of g/l product	100ml/100Lwater
	aantal toepassingen (+ interval)	Geen limiet (6 dagen interval)
werking (insecticiden)	opname in plant (W,T,LS,...)*	geen
	werking op insect/mijt (C,M,D)*	Mechanisch
	werking tegen stadia (E,L,N,A)*	L/N/A
	werkingssnelheid (nawerking)	2 minuten. Geen nawerking
	neveneffect op sluipwespen	Nee
	neveneffect op roofmijten	Gering

* Volgens **Federale Overheidsdienst Volksgezondheid** is Siltac SF **geen PPP** dus heeft geen toelating nodig. (PDF)

Volgens de **Europese Commissie**: Siltac is **not considered a PPP**, which is in line with other similar decisions taken in the past.

		Siltac SF
optimale toepassing	preventief/curatief	Curatief (preventief)
	sputen/aangieten/...	Sputen
	vloeistof: l/are of kg/are	0,1% (100ml / 100L water)
	solo OF combineren met hulpstof of GBM	Solo of combinatie
	1. invloed T° 2. invloed RV 3. invloed licht 4. invloed pH 5. invloed watertemptr	1. .Hoge temp is beter 2. .lage RV (<70%) 3. .nvt 4. .ideaal = 6 5. .nvt
	moment van toepassen	Overdag. Warm en droog (tussen 11:00 en 15:00)
	andere	Snel drogen is zeer belangrijk
goede resultaten	tegen ziekte of plaag	Spint, Witte Vlieg, Bladluis, Trips, Psylla
	in gewas(sen)	Potplanten, Tomaat, Komkommer, Aardbei, Aubergine, Sierteelt, Appel, Peer, Bessen, Bramen,



- Mechanische werking – residu vrij.
- Directe snelle werking
(https://www.youtube.com/watch?v=d1nvb_AOohQ&t=8s&ab_channel=LennartSchouten)
- Gering effect op nuttige insecten
 - (IPM Impact – Guido Sterk)
(<https://isananotech.com/wp-content/uploads/2023/04/IPM-Impact-newsletter-April-2023-Siltac-SF-v2.pdf>)
- Beste super uitvloeier (PCS)
(https://www.youtube.com/watch?v=DkTuJd3P-Qo&t=20s&ab_channel=LennartSchouten)
- Werkt op meerdere plaaginsecten tegelijkertijd

